

Mimiskis. Así llamó mi familia a mis convulsiones y no parecían tan aterradoras. Es difícil recordar la primera. Sé que estaba en la secundaria cuando comencé a sentir estas sensaciones de hormigueo

cerca de los ojos por uno o dos segundos. El médico me diagnosticó mal y me dio un antialérgico. Con el paso del tiempo, los episodios eran más frecuentes y dolorosos, aún sin diagnosticar. Me decían que estaba sana una y otra vez, pero sabía que no. Estaba luchando contra un enemigo que no podía ver. Era vergonzoso y peligroso.

En la adolescencia, quería conducir, bailar y pasar el rato con mis amigos. Así que me enfoqué en coexistir con mis mimiskis. Formas de sobrellevar la situación. No eran los mejores, pero me permitieron vivir mi vida. La intensidad continuó aumentando y seguí luchando contra ella. Algo tenía que pasar.

Un año después de que iniciaron las convulsiones, conocí a mi esposo. Juntos viajamos desde mis mimiskis hasta la revelación del enemigo real con un diagnóstico real de epilepsia, y juntos fuimos a Austin, adonde fue su camino. Las cosas empezaron a encajar. Conseguí un trabajo que despertó mi pasión: trabajar con niños con autismo y conocí al neurólogo que me presentó mi tratamiento actual.

Antes de XCOPRI, tenía múltiples convulsiones al día y ahora tengo una al mes o incluso menos. Con esa disminución, siento que estoy a cargo de mi vida nuevamente. Nunca te conformes con nada menos de lo que mereces.

Y para mis hermanos y hermanas, sé que a veces no nos gusta ir al médico, pero tenemos que cuidarnos. Encontraremos respuestas si seguimos buscando.

Las convulsiones me golpearon, pero soy una luchadora y no retrocedo. Volveré a la universidad para seguir con mi carrera. Hablaré por quienes no tienen voz y marcaré una diferencia en sus vidas. Esos niños me mantienen luchando por la posibilidad de cero convulsiones”.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SOBRE XCOPRI (COMPRIMIDOS DE CENOBA MATO) CV.

No tome XCOPRI si es alérgico al cenobamato o a cualquiera de los otros ingredientes de XCOPRI, o tiene un problema genético (llamado síndrome de QT corto familiar) que afecta el sistema eléctrico del corazón.

XCOPRI PUEDE CAUSAR EFECTOS SECUNDARIOS GRAVES, COMO ALERGIAS:

XCOPRI puede causar erupción cutánea grave u otras reacciones alérgicas graves en los órganos y otras partes del cuerpo, como el hígado o las células sanguíneas. Puede tener o no una erupción cutánea con estos tipos de reacciones. Tome XCOPRI como su proveedor de atención médica le indique. Es muy importante aumentar lentamente su dosis de XCOPRI, como le indique su proveedor de atención médica. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato y diríjase a la sala de emergencias si tiene los siguientes síntomas: hinchazón de cara, ojos, labios o lengua, problema para tragar o respirar; erupción cutánea; urticaria, fiebre, glándulas inflamadas o dolor de garganta, llagas en la boca o alrededor de sus ojos, coloración amarillenta de su piel o los ojos, hematomas o sangrados, fatiga o debilidad, dolor muscular, infecciones frecuentes o que no desaparecen. **Tome XCOPRI como su proveedor de atención médica le indique. Es muy importante aumentar lentamente su dosis de XCOPRI, como le indique su proveedor de atención médica.**

ACORTAMIENTO DEL QT: XCOPRI puede causar problemas con el sistema eléctrico del corazón. Llame a su proveedor de atención médica si tiene síntomas de acortamiento del QT, incluidos latidos rápidos del corazón que duran mucho tiempo o desmayos.

COMPORTAMIENTOS Y PENSAMIENTOS SUICIDAS: los fármacos antiepilepticos, incluido XCOPRI, pueden provocar pensamientos o acciones suicidas en un número muy pequeño de personas, 1 de cada 500. Llame a su proveedor de atención médica inmediatamente si presenta los siguientes síntomas: pensamientos suicidas o de muerte, intento de suicidio, depresión nueva o que empeora, ansiedad o irritabilidad, sensación de nerviosismo o inquietud, ataques de pánico, insomnio, comportamiento agresivo, enojo o violencia, impulsos peligrosos, aumento extremo de la actividad y de la conversación (manía), u otros cambios inusuales en la conducta o el estado de ánimo.

PROBLEMAS DEL SISTEMA NERVIOSO: XCOPRI puede afectar el sistema nervioso. Los síntomas de problemas del sistema nervioso incluyen: mareos, problema para caminar o de la coordinación, estar somnoliento y cansado, problemas para concentrarse, recordar y pensar claramente, y de visión. **No conduzca, opere maquinaria pesada ni haga otras actividades peligrosas hasta que sepa cómo le afecta XCOPRI.**

No beba alcohol ni tome otros medicamentos que puedan hacerlo sentir somnoliento o mareado mientras toma XCOPRI sin consultar con su proveedor de atención médica.

DISCONTINUACIÓN:

No abandone XCOPRI sin consultar primero con su proveedor de atención médica. Suspender XCOPRI repentinamente puede causar problemas graves. Dejar de tomar el medicamento anticonvulsivo de forma repentina en un paciente con epilepsia puede provocar convulsiones (estado epiléptico).

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS:

XCOPRI puede afectar la forma en que funcionan otros medicamentos y estos a su vez pueden afectar como funciona XCOPRI. **No empiece o deje de tomar otros medicamentos sin hablar con su proveedor de atención médica.** Informe a los proveedores de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

XCOPRI puede hacer que su medicamento anticonceptivo sea menos eficaz. **Hable con su proveedor de atención médica sobre el mejor método anticonceptivo.**

Diga si está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si XCOPRI dañará a su bebé no nacido. Informe de inmediato si queda embarazada mientras toma XCOPRI. Usted y su proveedor de atención médica decidirán si debe tomar XCOPRI mientras esté embarazada. Si queda embarazada mientras está tomando XCOPRI, hable con su proveedor de atención médica sobre inscribirse en el Registro de embarazos de fármacos

antiepilépticos de Norte América. El objetivo de este registro es recopilar información sobre la seguridad del antiepiléptico durante el embarazo. Puede inscribirse en este registro llamando al 1-888-233-2334 o visite www.aedpregnancyregistry.org.

Hable con su proveedor de atención médica si está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si XCOPRI pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica acerca de alimentar a su bebé mientras toma XCOPRI.

EFFECTOS SECUNDARIOS FRECUENTES:

los efectos secundarios más frecuentes incluyen mareos, somnolencia, dolor de cabeza, visión doble y sensación de cansancio.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios. Informe si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Para más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. **Puede informar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos llamando al 1-800-FDA- 1088 o en www.fda.gov/medwatch.**

ABUSO DE FÁRMACOS:

XCOPRI es una sustancia controlada federalmente porque se puede abusar de ella o generar dependencia. Mantenga XCOPRI en un lugar seguro. Vender o regalar de XCOPRI está en contra de la ley.

INDICACIÓN:

XCOPRI es un fármaco recetado para las convulsiones primarias en adultos de 18 años o más.

No se sabe si es seguro y eficaz en menores de 18 años.

Consulte la información del paciente en la Guía del medicamento.